



## Как передаются ИППП?

Большинство ИППП передаются при любой форме полового контакта. Кроме того, вирусные ИППП (папиллома вирусная и гепертическая инфекция) могут передаваться и во время тесного контакта ("кожа к коже"). Ты не заразишься ИППП через рукопожатие, в бане или бассейне, берясь за поручни в общественных местах, пользуясь общей с больным человеком посудой.



### Симптомы, которые должны насторожить тебя

- Необычные выделения из мочеиспускательного канала и половых путей, иногда - с неприятным запахом.
- Нарушение мочеиспускания (затруднение, учащение, болезненность).
- Зуд или жжение в половых органах или вокруг них.
- Язвы на половых органах и вокруг них.
- Похожие на бородавки образования на половых органах или вокруг них.
- Боли в нижней части живота или в области поясницы.
- Зуд, кровотечение и выделения в области прямой кишки.
- Нарушение менструального цикла.

Если ты обнаружил у себя хоть один из симптомов, постарайся как можно быстрее обратиться к врачу. Бесплатное обследование с целью выявления ИППП и их лечение ты можешь получить в нашем отделении.



**ПОМНИ**, что нередко ИППП не сопровождаются никакими клиническими симптомами. Если ты имел связь со случайным партнером, лучше не подвергать себя риску и обследоваться!

## Каковы последствия ИППП?

У **ЮНОШЕЙ** - воспаление предстательной железы (простатит), которое может приводить к сексуальным нарушениям, импотенции и бесплодию.

У **ДЕВУШЕК** - воспаление шейки матки, маточных труб и яичников, которое может приводить к бесплодию. **КРОМЕ ТОГО**, некоторые ИППП могут давать и более тяжелые осложнения - поражение суставов, нервной системы и внутренних органов.

**Что делать, если ты заразился ИППП или подозреваешь об этом?**

**ИППП полностью излечимы, если ты вовремя обратишься к врачу!**

- 1. ЛЕЧИ** инфекцию. После установления диагноза выполняй все рекомендации врача и пройди полный курс лечения, даже если симптомы исчезли и ты почувствовал себя лучше. Если ты не закончил лечение, симптомы могут повториться.
- 2. НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ** ИППП. Исключи половые контакты до тех пор, пока не закончишь лечение и не убедишься в том, что здоров.
- 3. ПОМОГИ** своему партнеру. Порой очень трудно сказать об этом, но это необходимо. Ты можешь привести полового партнера к своему врачу.
- 4. ВЕРНИСЬ К ВРАЧУ**, чтобы убедиться в том, что ты здоров. Обязательно пройди обследование после лечения.